


## La Cueva Pintada de Gáldar: Ensayo de interpretación




La “lanza” del  
pastor  
palmero,  
una tradición  
que se pierde



CAJA INSULAR  
DE AHORROS

GRAN CANARIA · LANZAROTE · FUERTEVENTURA



### PEZ GALLO

**CLASE:** Osteichthyes  
**ORDEN:** Zeomorphi (Zeiformes)  
**FAMILIA:** Zeidae  
**GENERO:** *Zeus* [Artedi] Linnaeus, 1758  
**ESPECIE:** *Zeus faber* Linnaeus, 1758  
**NOMBRES VULGARES:** El oficial en español es Pez de San Pedro. En Canarias recibe varios otros: GALLO CRISTO, Gallo San Pedro, Pez Gallo, Barbero.

**CARACTERES DESCRIPTIVOS:** Cuerpo muy comprimido, sin perder la simetría bilateral. Perfiles corporales con una doble fila de escudetes óseos y espinosos. Cabeza bastante grande, con boca oblicua, protractil y con dientes muy pequeños. La primera dorsal muy alta, con radios prolongados en filamentosos, y una espina debajo y a cada lado de ella. Línea lateral pronunciadamente curva.

**HABITAT:** Generalmente vive cerca del fondo, preferentemente de los arenosos o fangosos, donde suele reposar sobre uno de sus flancos y, a veces, llega a enterrarse en él. Pero, como consecuencia de su especial régimen alimenticio, también es mesopelágico e incluso pelágico. Vive a profundidades comprendidas entre pocos metros y 200 m. (en verano).

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA:** Muy amplia: Pacífico, Indico, Atlántico oriental (desde Noruega hasta Canarias), Mediterráneo y Mar Negro.

**REPRODUCCION:** Ovívpara. Huevos pelágicos. La freza va seguida de una migración trófica, en el transcurso de la cual se alimenta masivamente.

**ALIMENTACION:** Dieta alimenticia muy amplia (eurifagia): crustáceos, moluscos (incluidos los cefalópodos), gusanos, peces de fondo y gregarios (sardinas, arenques, pejerreyes,...).

**CRECIMIENTO MAXIMO:** Los 60 cms. de longitud total y algo más de 10 Kg. de peso.

**COLORACION:** El color general es gris amarillento con reflejos metálicos, variando desde un castaño oscuro (en dorso) hasta un amarillo blanquecino (en vientre). En sus flancos, destaca una mancha redondeada y negruzca con un halo amarillento.

**CURIOSIDADES:** Su carne es exquisita. Se captura con redes de enmalle ("trasmallos") y palangres. Cuenta la leyenda que San Pedro tomó el pez del agua y extrajo una moneda de su boca, con la que pagó los impuestos al César de Roma. Al sujetar al pez, le imprimió las huellas de sus dedos pulgares sobre los flancos.

J.A. GONZALEZ PEREZ  
 Biólogo del Centro de Tecnología Pesquera

# FAUNA CANARIA

## PECES



### TAPACULO

**CLASE:** Osteichthyes  
**ORDEN:** Heterosomata (Pleuronectiformes)  
**SUBORDEN:** Pleuronectoidei  
**FAMILIA:** Bothidae  
**GENERO:** *Bothus* Rafinesque, 1810  
**ESPECIE:** *Bothus podas*  
**SUBESPECIE:** *Bothus podas maderensis* (Lowe, 1834)  
**NOMBRES VULGARES:** El oficial en español es Podás. En Canarias se conoce como Tapaculo.

**CARACTERES DESCRIPTIVOS:** Cuerpo fuertemente comprimido, corto y alto, manifiestamente asimétrico. Ojos y flanco pigmentado en el costado izquierdo. Dimorfismo sexual acentuado (machos con el perfil anterior de la cabeza casi vertical, con los ojos más separados que las hembras y con espinas en la región rostral).

**HABITAT:** Bentónico. Vive semienterrado en fondos arenosos o fangosos.

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA:** *Bothus podas* comprende 3 subespecies (diferenciables por el número de escamas de la línea lateral, la posición de una mancha característica sobre la misma y la coloración general):

- 1) *Bothus podas podas* (Delaroche, 1809): Mediterráneo.
- 2) *Bothus podas africanus* Nielsen, 1961: Costa O. de África, desde C. Blanco hasta Angola.
- 3) *Bothus podas maderensis* (Lowe, 1834): Archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde.

**REPRODUCCION:** Ovívpara. Desovan en primavera. Huevos muy pequeños y provistos de una gota de grasa para su flotación.

**ALIMENTACION:** Come pequeños moluscos, gusanos, crustáceos, peces, etc.

**CRECIMIENTO MAXIMO:** Alcanza los 22 cms. de longitud total, con un peso de unos 140 g.

**COLORACION:** Flanco izquierdo de color variable, imitando el del fondo sobre el que vive (homocromía). Domina el gris y el pardo verdoso, más o menos abigarrado por manchitas blancas rodeadas de negro. Flanco derecho blanquecino, con bandas rosadas en posición anterior.

**CURIOSIDADES:** Animal pasivo, que forma poblaciones dispersas y de actividad nocturna. Importancia comercial escasa. Se pesca con chinchorros, nasas y trasmallos.

J.A. GONZALEZ PEREZ  
 Biólogo del Centro de Tecnología Pesquera