



agwa y ro


N.º 171 - Mayo-Junio, 1987



Alzado Sur



Alzado Este



Alzado Oeste

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



LA CAJA
DE CANARIAS

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



RAYA

CLASE: Condroictios (Esqueleto cartilaginoso).

ORDEN: Hypotremata.

SUBORDEN: Rajoidei.

FAMILIA: Rajidae.

GÉNERO: Raja.

ESPECIE: *Raja sp.* Linneo, 1758.

CARACTERES DESCRIPTIVOS: Forma aplastada, rostro algo puntiagudo. Disco más ancho que largo. Piel con espinas distribuidas irregularmente dependiendo de la especie. Dos aletas dorsales al final de la cola. Cola desprovista de aguijón. Boca provista de dientes puntiagudos o romos dependiendo de la especie. En los machos el aparato sexual es muy patente.

COLORACIÓN: Muy variable, predominando la coloración parda o gris con motas negras. En algunas especies se distinguen perfectamente ocelos.

HÁBITAT: Bentónico, en zonas arenosas y grutas en la zona litoral. Desde los 2 metros hasta los 150 metros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Las rayas son peces que se distribuyen por la mayoría de mares y océanos, siendo bastante cosmopolitas. En Canarias están citadas alrededor de 10 especies diferentes.

REPRODUCCIÓN: A diferencia de otros elasmobranquios, es ovípara. Aunque como todos ellos la fecundación es interna. Aprovecha la época de primavera-verano, para acercarse a las orillas del litoral a realizar la freza.

ALIMENTACIÓN: Carnívora, especialmente de otros peces y cefalópodos. Es muy voraz.

PESCA Y CURIOSIDADES: En Canarias se le pesca con palangre y trasmallo, en este último caso se envuelven en la red cuando van a depredar a especies ya enmalladas. Es un recurso que

por su cantidad podía estar mejor explotado. De sus aletas y parte del tronco, se consiguen los tollos o se pueden preparar las famosas “mujamas”.

FAUNA CANARIA

PECES

PEGADERA

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Xenopterygi (Gobiesociformes).

FAMILIA: Gobiesocidae.

GÉNERO: Lepadogaster.



ESPECIE: *Lepadogaster lepadogaster lepadogaster* (Bonnaterre, 1788).

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo aplastado y sin escamas. Dorso algo curvado. Rostro deprimido con boca grande y labios carnosos. Dos pequeños apéndices en cada abertura nasal. Posee una doble ventosa (característica de la familia) entre las aletas ventrales que le permite fijarse fuertemente a las piedras y objetos que suelen formar su nicho. Carece de vejiga natatoria. Su nombre científico, se traduce como “vientre en la piedra”.

COLORACIÓN: Muy diversa y abigarrada, predominando los tonos azules, verdes y rojos. Motas y bandas trasversales por todo el cuerpo.

HÁBITAT: Zona intermareal (charcas), y primer nivel de la infralitoral. Debajo de las piedras a las que se adhiere. Un hábitat característico en su relación comensal lo tiene en el llamado “abanico” lamelibranquio de nuestras costas. Es un pez muy sedentario.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Mediterráneo, Mar Negro y Canarias, donde es bastante común.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. Deposita la puesta de alrededor de 200 huevos en conchas o debajo de piedras, siendo cuidada por la pareja.

ALIMENTACIÓN: Carnívora. De pequeños organismos especialmente invertebrados.

LONGITUD MÁXIMA: Llega a medir 8 cms.

PESCA Y CURIOSIDADES: Carece de interés gastronómico. Su coloración y comportamiento pueden resultar interesante para su estancia en un acuario. En Canarias están citadas 5 especies de esta familia.

RICARDO CASTILLO EGUÍA

Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte