

## LAGARTO GIGANTE DE SALMOR

Clase: Reptiles

Orden: Squamata

Familia: Lacertidae

Género: *Gallotia* (=Lacerta)

Especie: *G.(L.) simonyi* (Steindachner, 1889).

Subespecie: *G.(L.) simonyi simonyi*

Nombre vulgar: lagarto de Salmor.

Hábitat: exclusivamente en el escarpado Risco de Tibataje, cerca de la Fuga de Gorreta (El Hierro).

Epoca de apareamiento y puesta: desconocida.

Número de huevos por puesta: desconocido.

Longitud máxima (cabeza-cola)= 70-80 cm.

Coloración: Todos los ejemplares observados presentaban un color tierra oscura. Los ejemplares jóvenes eran casi negros y los adultos tenían manchas amarillas en los costados del cuerpo.

# FAUNA CANARIA

## REPTILES


Es una especie de estatus desconocido, aunque por el número escaso de ejemplares que se han visto puede pensarse que esté en peligro de extinción, por lo que son necesarias urgentes medidas de protección y estudio

Por la situación de la zona donde habitan, los rayos solares no llegan hasta allí sino hasta horas

próximas al mediodía, por lo que su periodo de actividad debe ser más reducido que el de otros lagartos canarios.

Esto, junto con: el número pequeño de ejemplares existentes, lo escabroso del terreno que ocupan (con frecuentes caídas de material desde las alturas del Risco), los posibles predadores (cernícalos u otras rapaces), la presencia aún de cabras en el Risco, y la posible actuación humana futura (existe un proyecto de construcción de planta de machaqueo de piedras en la base de la Fuga de Gorreta) hacen que su situación en cuanto a supervivencia sea muy precaria. Todas las medidas que se tomen pues para su conservación son pocas.

Foto y texto:  
**M. MOLINA BORJA**



Distribución de *Gallotia (L.) Simonyi*



## PERENQUEN

Clase: Reptilia  
 Orden: Squamata  
 Familia: Gekkonidae  
 Género: *Tarentola*  
 Especie: *T. delalandii* (Dumeril & Bibron)

Nombres vulgares: Perenquén, perinquén, salamnquesa, salamandra, gecko, placán...

Hábitat: Inmediaciones de viviendas humanas, también en el campo, bajo piedras, etc.

Puesta: Dos huevos de 13 X 10 milímetros. Las crías nacen después de unos cuatro meses.

Longitud: Puede llegar hasta 15,5 centímetros.

Peso: De 10 a 12,5 gramos.

Coloración: Generalmente blanquecino, con pequeñas motas oscuras.

# FAUNA CANARIA

## REPTILES

Se mimetiza perfectamente y es sorprendente la facilidad que tiene para cambiar la tonalidad de su coloración.

Distribución: Tenerife, Gomera, La Palma y Hierro.

Para estas cuatro islas citadas, se ha descrito la ssp. *delalandii* Loveridge

De hábitos nocturnos, aunque también es posible verlo por el día tomando el sol.

Suele encontrarse en las inmediaciones de la vivienda humana, en el campo, bajo las piedras, ruinas, etc.

Su alimentación la constituyen los insectos y arácnidos; suelen acercarse a las lámparas de las viviendas humanas, durante la noche, para cazar pequeños lepidópteros nocturnos y dípteros.

La hembra pone dos huevos en el interior de alguna grieta o hendidura de paredes de piedra.

En la isla de Tenerife se pueden encontrar "perenquenes" a alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Foto y Texto:  
**FRANCISCO PEREZ PADRON**

