

* Boletín Informativo * aguayro

Nº 162 - Noviembre-Diciembre, 1985



© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



**LA CAJA
DE CANARIAS**

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



Galana

GALANA

CLASE: Osteictios (Esqueleto óseo).

ORDEN: Percomorphi (Perciformes).

SUBORDEN: Percoidei.

FAMILIA: Sparidae (Espáridos).

GÉNERO: Oblada.

ESPECIE: *Oblada melanura* (L., 1758).

CARACTERES DESCRIPTIVOS: Cuerpo oblongo poco comprimido. Ojos grandes. Coloración dorsal azulada y flancos plateados con cierto reflejo azulado. Leves franjas longitudinales grises. Mancha negra en la parte superior del pedúnculo caudal. Vientre blanquecino.

HÁBITAT: Gusta de fondos rocosos y blandos en íntima relación con él pero alternando con zonas superficiales del agua donde viven en grandes grupos. No sobrepasan generalmente los 30 m. de profundidad.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Mediterráneo, Adriático, Mar Negro. En el Atlántico oriental desde Madeira y Canarias hasta Angola. Común en Canarias y Cabo Verde.

REPRODUCCIÓN: Ovípara en meses de mayo a julio.

ALIMENTACIÓN: Omnívora especialmente pequeños invertebrados.

LONGITUD MÁXIMA: Mide hasta 30 cms.

CURIOSIDADES: Se pesca con trasmallo principalmente, y con caña desde la orilla en la deportiva engodando previamente. Su carne es buena.

FAUNA CANARIA

PECES

BESUGO

CLASE: Osteictios (Esqueleto óseo).

ORDEN: Percomorphi (Perciformes).


SUBORDEN: Percoidei.

FAMILIA: Sparidae (Espáridos).

GÉNERO: Pagellus.

ESPECIE: *Pagellus acarne* (Risso, 1826).

Besugo



CARACTERES DESCRIPTIVOS: Cuerpo fusiforme algo comprimido. Perfil de la cabeza levemente deprimido encima de los ojos. En las dos mandíbulas dientes, puntiagudos los de delante y molariformes los de detrás. Coloración gris rosácea más pronunciada sobre el dorso; flancos y vientres más claros. Mancha oscura muy visible al comienzo (axila) de la aleta pectoral. Interior de la boca color anaranjado.

HÁBITAT: Bentónico de zonas costeras, en profundidades de hasta 500 m., común entre 4 a 100 m. Alterna el fondo rocoso (marisco) con fondos de arenas con fanerógamas marinas (sebas).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Atlántico oriental desde Dinamarca e Islas Británicas, Gibraltar hasta el norte del Senegal, Madeira, Canarias (muy común) y Cabo Verde. Mediterráneo.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. En finales de primavera y verano. Hermafrodita protándrico (primero son machos y después hembras).

ALIMENTACIÓN: Omnívora con predominio carnívoro (moluscos y pequeños crustáceos).

LONGITUD MÁXIMA: Puede alcanzar 30 cms.

CURIOSIDADES: Se le pesca con trasmallo, nasa y anzuelo, esto último en la deportiva desde embarcación. Bastante voraz. Su carne es buena preferiblemente si se come fresca.

RICARDO CASTILLO EGUÍA
Centro de Tecnología Pesquera