


aguayro

* Boletín Informativo *

Nº 164 - Marzo-Abril, 1986



© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



LA CAJA
DE CANARIAS

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



Tamboril Chico

TAMBORIL CHICO

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Plectognathi (Tetraodontiformes).

SUBORDEN: Tetraodontidei.

FAMILIA: Canthigasteridae.

GÉNERO: Canthigaster.

ESPECIE: *Canthigaster rostrata* (Bloch, 1786).

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo oblongo algo comprimido. Rostro alargado y agudo. Cabeza comprimida con boca terminal. Una sola aleta dorsal corta y retrasada. Carece de escamas y su piel es casi completamente lisa. Vientre muy distensible. Dientes a modo de 4 placas de donde viene el nombre científico del orden. Rostro, flancos y vientre blancos. Dorso pardo claro o beige, con tonalidades moradas en la parte superior posterior lateral del cuerpo. Rostro, vientre y flancos salpicados con innumerables motitas azuladas, sobre todo cuando vivo.

HÁBITAT: Béntico y litoral alternando fondos rocosos y de arena con fanerógamas, hasta los 60 m. aproximadamente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Atlántico Oriental y Occidental, desde Madeira hasta Angola pasando por Canarias que es muy común; y en Bermudas y Golfo de México.

REPRODUCCIÓN: Ovípara poco conocida.

ALIMENTACIÓN: Esencialmente carnívora, sus poderosos dientes triturarán fácilmente moluscos y crustáceos.

LONGITUD MÁXIMA: Llega a medir 15 cms., lo común son 10 cms.

CURIOSIDADES: El tamboril es un vistoso pez de pequeños colores digno de exhibirse en un acuario. Su carne

no es apreciada tanto por las dimensiones del pez como por la dificultad de prepararla el tamboril de profundidad *S. cutaneus* sí es aprovechado su vientre, con el que se preparan deliciosos filetes. Los tamboriles son pesadilla de los pescadores deportistas ya que cortan fácilmente el sedal con sus dientes.

RICARDO CASTILLO EGUÍA
Centro de Tecnología Pesquera de G.C.

FAUNA CANARIA

PECES

Salmonete



SALMONETE, SALMON

CLASE: Osteictios.

ORDEN: Percomorphi (Perciformes).

SUBORDEN: Percoidei.

FAMILIA: Mullidae.

GÉNERO: Mullus.

ESPECIE: *Mullus surmuletus* Linnaeus, 1758.

CARACTERES DESCRIPTIVOS:

Cuerpo alargado y algo aplanado. Escamas grandes y caedizas. Boca pequeña con dientes finos en ambas mandíbulas, a veces en una sola. Dos aletas dorsales bien diferenciadas. Dos barbillas en la parte inferior de la mandíbula. Coloración roja, rosácea, más pálida en los flancos, con bandas longitudinales amarillas, vientre blanco. Notoria mancha negra en los radios de la primera dorsal.

HÁBITAT: Béntico, en fondos de arena y cercanía de rocas, cercano al litoral. Vive formando grandes grupos entre los 5 a 80 metros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

En el Atlántico Oriental desde Noruega (raro) Madeira, Canarias (muy común) hasta Senegal. Mar Báltico y Mediterráneo.

REPRODUCCIÓN: Ovípara y en verano.

ALIMENTACIÓN: Carnívora principalmente a base de pequeños gusanos y diminutos crustáceos así como moluscos, los cuales deja al descubierto de la arena removiendo con sus barbillas el fondo.

LONGITUD MÁXIMA: Llega a medir 40 cms.

CURIOSIDADES: El salmonete es un pez muy apreciado, que es pescado en nuestras costas con artes esencialmente pasivas como el trasmallo y la nasa. En la pesca deportiva el cebo más apreciado es la lombriz y en pesca de lanzado a fondo.

RICARDO CASTILLO EGUÍA
Centro de Tecnología Pesquera de G.C.