

Nota Miscelánea: "HELECHOS CULTIVADOS"

En 1967 hemos publicado "Helechos cultivados" (o descripción ilustrada de 40 especies cultivadas en las Islas Canarias). El libro apareció en la serie IV, Ciencias, editado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

Desde aquel tiempo, y según la opinión de los distintos autores, han cambiado algunos nombres como p. ej. *Adiantum cuneatum* (p.42) y *A. decorum* (p.44) que, según R.M. Tryon, pertenecen a *Adiantum raddianum*.

*Alsophila australis* R. Br. (p. 79), corregido (p.175) en *A.cooperi* Hook. ex F.v.Muell., según Tryon (Contr. Gray Herb. 200:24; 1970) debería llamarse correctamente *Sphaopteris cooperi* (F.v.Muell.) Tryon.

En *Platynerium* (pp. 95-97) la situación pertenece insegura. E.A.C.L.E. Schelpe (Contr. Bolus Herb. 1:89; 1969) prefiere *Platynerium alcornone* Desf., nombre rechazado p. ej. por C. V. Morton (Amer. Fern Journ. 60:7-12; 1970) en favor a *P.vassei* Poiss. (vease también p.175 del libro).

También en *Cyclosorus* (p.137-138) la situación nomenclat6rica demuestra inconstancia. Para nuestro *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching (ex- *Polypodium dentatus*, ex- *Dryopteris dentata*, ex-*Lastrea dentata*, ex-etc.) autores americanos cuentan hoy en d6a con *Thelypteris dentata* (Forssk.) St. John. En la Brit. Fern Gaz. 10:338 (1973) se present6 un nombre m6s moderno a6n: *Christella dentata* (Forssk.) Brownsey & Jermy.

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. (p. 67) tampoco tiene constancia: *Scolopendrium vulgare* y *S. officinarum* son sin6nimos conocidos, y el bas6nimo es *Asplenium scolopendrium* L., nombre adaptado nuevamente por Brownsey & Jermy en Brit. Fern Gaz. 10:340 (1973), mientras que Wilmanns & Rasbach (en el mismo n6mero de la misma revista, p. 326) prefieren *Phyllitis* como arriba mencionado.

Sin embargo, nada peor para (o como) una especie que he publicado (p. 100) como *Pessopteris crassifolia*. Bajo este mismo nombre específico bien claro y sin considerar otros sinónimos específicos tenemos

*Polypodium crassifolium* L. (1753), nombre original.

*Anaxetum crassifolium* (L.) Schott (1834),

*Phymatodes crassifolia* (L.) Presl (1836),

*Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm. (1841),

*Dipteris crassifolia* (L.) J. Sm. (1842),

*Pleuridium crassifolium* (L.) Fée (1852),

*Pleopeltis crassifolia* (L.) Moore (1857), y

*Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon (1908).

Y ahora, en el Amer. Fern Journ. 62:106 (1972), D.B. Lellinger presenta un nuevo nombre: *Niphidium crassifolium* (L.) Lellinger (1972). Lo que nos demuestra que somos inventores ya de categoría.

G. Kunkel