

ALCAUDON REAL

Clase: Aves
Orden: Paseriformes
Familia: Lánidos
Género: *Lanius*
Especie: *L. excubitor* L.
Nombres vulgares: Alcairón, Alcaudón
Habitat: Lugares áridos con matorral (tabaibas, balos, aulagas, tabaco moro). En Tenerife también nidifica en zonas de retamares y ocasionalmente en codesos y escobones sobre los 2000 ms. de altitud.
Nidificación: marzo – junio.
Número de huevos: 2 a 5
Longitud: 24 cms. Peso: 50 – 70 grs.
Plumaje: La coloración se reparte entre el gris, negro y blanco. La cola es larga y oscura con una porción de blanco sucio en la punta de las rectrices centrales. El pico es grande con la mandíbula superior encurvada y denticulada.
Distribución: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. También ha sido citado para La Palma, pero no tenemos datos fidedignos de su presencia.

Aunque tiene el aspecto de una pequeña rapaz, se trata de una Paseriforme, sus patas no están dotadas de fuertes garras como las de las aves de rapiña, pero la fortaleza de las mismas es bien notoria.

Las poblaciones de Canarias pertenecen a la ssp. *koenigi* Hart.

Se alimenta de pequeños vertebrados tales como: lagartos, perenquenes, ratoncillos, ranas, pájaros, asimismo captura insectos de tamaño medio como: saltamontes, grillos, escarabajos, etc. Suele clavar o ensartar las piezas capturadas en algún espino o ramita afilada, procurándose de esta manera una buena despensa de provisiones.

Puede emplazar el nido en una retama, tabaiba, cardón etc. En Lanzarote y Fuerteventura (donde esta ave es más común) hemos encontrado nidos sobre cupresos y plantas ornamentales. Normalmente aparece construido con pequeñas ramitas, tallos secos, pedazos de tela y pelo animal.

Foto: M. Fernández Galván
Texto: F. Pérez Padrón



FAUNA CANARIA

AVES



PALOMA BRAVIA

Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Colúmbidos
Género: *Columba*
Especie: *C. livia* Gm.
Nombre vulgar: Paloma Bravía
Habitat: Barrancos, montes y acantilados
Nidificación: marzo – julio.
Número de huevos: 1 – 2
Longitud: 33 cms.
Plumaje: Tonalidad general gris azulada, con los lados del cuello jaspeados de verde y violeta iridiscente. Obispillo blanco. Franjas alares negras. ♂ = ♀
Distribución: Todas las islas e islotes.

En Canarias vive la ssp. *canariensis* Bann., algo más pequeña que la raza típica (32 cms.) así como más oscura por la parte ventral y con el obispillo de color blanco – sucio. Se trata de una ave muy castigada por los cazadores, por lo que las colonias más numerosas se encuentran restringidas a los acantilados y barrancos particularmente inaccesibles.

El clásico arrullo de la Paloma Bravía es prácticamente idéntico al de la paloma doméstica, a cuyas bandadas suelen unirse (PADRON, 1978).

Se alimentan de granos, semillas, algunos frutos y pequeños invertebrados (moluscos, ocasionalmente insectos, etc.). Nidifican en huecos y grietas de acantilados y paredes de barrancos.

Su área de alimentación o búsqueda de la comida es muy amplia, pudiendo observárselas comiendo en el suelo en pinares, bordes de laurisilva, cultivos, etc.

Foto: M. Fernández Galván
Texto: J.J. Bacallado
(Grupo Ornitológico Canario)

