

A.— LA ZONA BAJA

La zona baja se caracteriza por un clima cálido y seco con una insolación alta. Dentro de ella podemos distinguir dos subzonas atendiendo a la composición vegetal. En primer lugar encontramos una faja litoral sujeta a la influencia del "spray" marino (cloruro sódico), lo que determina una vegetación de halófilas variable según se trate de acantilados o de playas. En general se trata de plantas y arbustos tales como: *Suaeda*, *Salsola*, *Mesembryantemum* (barrilla), *Launaea* (aulaga), etc. Este tipo de formación vegetal alcanza su mayor desarrollo en las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) las cuales, debido a su bajo relieve, permiten que la citada influencia marina se difunda ampliamente a través de ellas. En las islas occidentales es de escasa altitud, alcanzando en casos extraordinarios los 100 ms.

Sigue una faja sublitoral con dominio de plantas suculentas tales como tabaibales y cardonales, así como otras de porte arbóreo: tarajales, balos, palmeras y dragos. La extensión de esta faja es muy variable, siendo más amplia en la parte Sur de las Islas, especialmente en las de Tenerife y Gran Canaria; en las orientales aparece restringida a las laderas de las montañas. Así, pues, su extensión altitudinal es variable, pero generalizando podemos decir que alcanza los 300 ms. en el N—NE, frente a los 600 ms. en el S—SW.

Evidentemente todos estos enclaves citados son quizás los más alterados por la mano del hombre, ya que es en dichas zonas donde se asientan los principales complejos turísticos, pueblos, villas, cultivos, etc.

Texto: Keith W. Emmerson
Fotos: J.J. Bacallado, A. Machado
y K.W. Emmerson

FAUNA CANARIA

AVES

HABITAT




Foto 1. Playas y acantilados (Aleganza) (Foto J. Bacallado)

Avifauna representativa

Pardela cenicienta
Pardela chica

Petrel de Bulwer
Aguila pescadora

Halcón de Eleonor
Chorlito patinegro

Gaviota argéntea
Charrán común

Paloma bravía



Foto 2. Vegetación natural en zona baja (Sur de Tenerife) (Foto A. Machado)

Avifauna representativa

Guirre	Alcaraván	Bisbita caminero	Alcaudón	Pájaro moro
Cernícalo	Tórtola	Terreña marismeña (calandria)	Curruca tomillera	Cuervo
Perdiz moruna	Abubilla		Mosquitero	



Foto 3. Llanuras y laderas de las islas orientales (Fuerteventura) (Foto K. W. Emmerson)

Avifauna representativa

Guirre				
Ratonero común (aguililla)	Perdiz moruna	Ganga	Bisbita caminero	Tarabilla canaria
Cernícalo	Hubara	Abubilla	Alcaudón	Pájaro moro
	Alcaraván	Terrera marismeña	Curruca tomillera	Cuervo