

**Clase:** Osteichthyes  
**Orden:** Percomorphi (Perciformes)  
**Suborden:** Percoidei  
**Familia:** Sparidae  
**Género:** *Lithognatus*  
**Especie:** *Lithognatus mormyrus* (Linnaeus, 1758)  
**Nombre vulgar:** Herrera

**Habitat:** Especie típicamente bentónica. Vive en la zona litoral hasta unos 20 metros de profundidad, frecuentemente agrupados sobre fondos arenosos. Los ejemplares jóvenes se aproximan mucho a la costa penetrando en los puertos. Lozano L., 1952, indica que penetra en la desembocadura de los ríos y puebla las lagunas litorales, resistiendo variaciones de temperatura y salinidad.

**Reproducción:** Ovípara. La Herrera, como todas las especies de la familia Sparidae, presenta inversión sexual; es decir, que el mismo individuo pasa durante toda su vida por los dos sexos. Alcanzan la madurez sexual en verano produciéndose la freza masiva al final del verano. Los huevos son planctónicos (flotantes).


**Longitud máxima:** 40 cms. común 25 cms.  
**Alimentación:** Carnívora, a base de pequeños crustáceos, moluscos y gusanos.

**Color:** Coloración de fondo gris-plateada, dorso de gris a pardo claro; flancos recorridos por 6 bandas transversales pardo oscuras intensas, alternando con otras 6 más cortas de tonalidad más débil. Vientre blanquecino.

**Distribución:** Se encuentra en el Mediterráneo (excepto Mar Negro). En el Atlántico Oriental se extiende desde el Golfo de Gascuña hasta el Cabo de Buena Esperanza. En nuestras islas es una especie abundante.

Su carne es de excelente calidad. Se captura normalmente con trasmallo y nasa y ocasionalmente individuos muy jóvenes con chinchorro.

**Foto:** Centro de Tecnología Pesquera de Gran Canaria  
**Texto:** Dolores C. Ojeda Guerra



# FAUNA CANARIA

## PECES

**Clase:** Peces  
**Orden:** Zeiformes  
**Familia:** Caproidae  
**Género:** *Capros*  
**Especie:** *Capros aper* (Linnaeus, 1758)  
**Nombre vulgar:** Ochavo


**Habitat:** Bentónico, en fondos rocosos y coralígenos desde unos 50 hasta unos 400 metros.

**Reproducción:** Ovípara.  
**Longitud máxima:** Unos 15 centímetros.  
**Alimentación:** Carnívora (crustáceos principalmente).

**Coloración:** Color rojizo claro más o menos uniforme. Cuando se ve acosado o está excitado adopta una coloración a bandas o manchas rojizas y claras.

**Distribución:** Mediterráneo y Atlántico oriental desde Noruega y las Islas Británicas hasta Canarias y Mauritania.

**Observaciones:** Se capturan algunos ejemplares en trasmallos y nasas colocados a cierta profundidad. Tiene muy poca importancia pesquera.



**Texto y foto:** A. Brito  
Departamento de Ciencias Marinas  
Universidad de La Laguna