



## LAGARTO DE HARIA

Clase: Reptilia  
 Orden: Squamata  
 Familia: Lacertidae  
 Género: Lacerta  
 Especie: *L. atlantica* Peter y Doria  
 Nombre vulgar: Lagarto de Haría

Habitat: Zonas áridas, paredes, muros, grietas de lava volcánica, etc.  
 Puesta: una o dos al año, de tres a cuatro huevos cada una.  
 Los jóvenes llegan a la madurez sexual a los dos años.  
 Longitud: Los ♂♂ pueden llegar a los 24 centímetros.  
 Peso: De 10 A 20 gramos.

# FAUNA CANARIA

## REPTILES


Coloración: Los ♂♂ adultos presentan el dorso oscuro y la cabeza negruzca; los flancos con motas de color azul brillante; garganta y collar gris azulado, y el vientre oscuro.

Distribución: Lanzarote, Fuerteventura, Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Lobos.

Eate bello lagarto, está adaptado para vivir en las más áridas condiciones de las islas orientales. En cualquier lugar que presente vestigios de vegetación, pueden descubrirse tratando de dar caza a pequeños insectos, gusanos, moluscos. Aunque creemos que se trata del lagarto más entomófago de las islas, no por ello deja de alimentarse con frutos (*Opuntia dillenii* y *O. ficus indica*), semillas y algún vegetal.

Texto y foto:

FRANCISCO PEREZ PADRON



Distribución de *Gallotia (L.) atlantica*



### LAGARTIJA DE GRAN CANARIA

Clase: Reptilia  
 Orden: Squamata  
 Familia: Scincidae  
 Género: *Chalcides*  
 Especie: *C. sexlineatus* Boettger y Müller.  
 Nombre vulgar: Lagartija, lisa.  
 Crías: Dos  
 Longitud: 12 cms. Peso: 10 a 15 grs.

Descripción: Es algo más pequeña y delgada que *C. ocellatus occidentalis* de Lanzarote y Fuerteventura, con patas cortas y débiles. El dorso es castaño con motas brillantes distribuidas en hileras longitudinales. Flancos castaño negruzco, separados desde el dorso por una línea supraocular brillante, bordeada de negro. Las partes

# FAUNA CANARIA


## REPTILES

inferiores son amarillentas, o blanco verdosas, con muchos puntos pequeños grises en el vientre. En los jóvenes la cola es de color azul metálico. Distribución: Solamente la isla de Gran Canaria.

Esta bella lagartija la hemos encontrado en numerosos habitats, paredes de muros de piedra, barrancos, campos cultivados, casas de campo, etc. Su alimentación consiste en pequeños insectos, crustáceos, moluscos, gusanos y ocasionalmente algún fruto.

Las  $\text{O}\text{O}^{\times}$  son vivíparas y paren dos crías. Al parecer, la coloración brillante de la cola de los jóvenes viene a ser como una señal de peligro para impedir que sean atacados por los ejemplares adultos.

Foto y texto:  
FRANCISCO PEREZ PADRON



Distribución de *Chalcides sexlineatus*