



© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



LA CAJA
DE CANARIAS



BLANQUIVERDOSA

Phyllum: *Arthropoda*

Clase: *Insecta*

Orden: *Lepidoptera*

Familia: *Pieridae*

Género: *Pontia*

Especie: *Pontia daplidice* (L., 1758).

DESCRIPCIÓN: Dorso de las alas blanco. En los ápices de las anteriores se disponen cinco manchas negras difusas que se unen por sus correspondientes estrangulamientos a tres subdiscales. En el disco hay una mancha negra de contornos irregulares. Los planos posteriores con cuatro manchas negras y dejando ver las verdes de la fase ventral: las dos centrales mayores y unidas a otras dos más pequeñas. Las hembras con manchas más amplias y fuertes, con una suplementaria en posición más retrasada y pequeña que la discal. Envergadura alar: 45 mm.

BIOLOGÍA: Sus larvas viven sobre alfalfa, *Reseda* y diversas crucíferas, como *Hirschfeldia incana* y *Descurainia*.

Los adultos, como todas las mariposas diurnas, se alimentan gracias a una espiritrompa que le sirve de conducto para tomar el néctar de las flores: Tienen preferencia por libar las plantas de hábitos rastreros.

Suelen volar en las zonas secas acompañados por adultos de otras especies como *P. rapae*, *P. xiphioides*, *P. daplidice*, *C. crocea* y *C. cardui*.

DISTRIBUCIÓN: Presente en Eurasia, Norte de África, Norteamérica. En Canarias en todas las islas a lo largo de todo el año, aunque más abundantemente durante la primavera y principios del verano.

FAUNA CANARIA

MARIPOSAS

BLANCA VERDIRAYADA

Phyllum: *Arthropoda*

Clase: *Insecta*

Orden: *Lepidoptera*

Familia: *Pieridae*

Género: *Euchloe*

Especie: *Euchloe belemia* (Esper, 1799).



DESCRIPCIÓN: El dorso de las alas es blanco con unas manchas negras cerca del ápice de las anteriores. Posee una mancha cuadrangular negra en el extremo de la celda, que casi toca el margen costal o anterior del ala y que en su reverso tiene inscrita una línea blanca. Las posteriores dejan ver el diseño de rayas verdes que tiene en su lado ventral (de donde le viene su nombre vulgar). Estas bandas verdes se disponen cuasiparalelas entre sí, tocándose y soldándose en numerosos puntos, pero sin tomar el aspecto reticulado que adquieren en *P. daplidice*. Cuando se ve la mariposa en vuelo parece un pequeño ejemplar de *Pontia daplidice*. Para diferenciarlas, basta saber que *E. belemia* carece en el lado inferior de las alas anteriores de un punto posdiscal negro, así como la ausencia en la cara inferior de las alas posteriores de un punto blanco aislado. Envergadura alar: 3,2 cms.

BIOLOGÍA: Las orugas se alimentan de crucíferas como *Descurainia* y *Erysimum*.

DISTRIBUCIÓN: Es una especie de distribución mediterránea. En las Islas Canarias se puede encontrar desde los 700 a los 2.500 metros de altitud, con un máximo de abundancia en la zona de alta montaña, especialmente durante los meses de marzo a junio. Vuela en Tenerife (la subespecie *eversi*) y Gran Canaria (la subespecie *hesperidum*). Algún autor la ha citado para Fuerteventura. Sorprende, en cambio, que no se haya citado para La Palma.

Textos y Fotografías:

MIGUEL ÁNGEL PEÑA ESTÉVEZ
Biólogo del Servicio Agrícola de la
Caja Insular de Ahorros de Canarias