

PINZON AZUL



Clase: Aves
Orden: Paseriformes
Familia: Fringílidos
Género: *Fringilla*
Especie: *F. teydea* M. — T.
Distribución: Tenerife y Gran Canaria.

Nombres vulgares: Pinzón azul, pájaro azul del Teide, cumbbrero.

Habitat: Pinar de *Pinus canariensis*

Nidificación: Mayo — Junio — Julio

Número de huevos: 1 ó 2

Longitud: 17,5 — 18 cms. Peso medio: 30 — 32 gr.

Plumaje: Macho, azul—plomizo: hembra, pardo grisáceo.

De las tres especies de aves endémicas que viven en el Archipiélago Canario, el Pinzón Azul es, con toda probabilidad, la más bella y diferenciada. Dentro de su género se trata de la especie más grande y robusta, destacando asimismo la gran fortaleza y longitud de su pico, sin duda adaptado al tipo de alimentación: las semillas del pino canario.

La raza típica, de Tenerife, vive y nidifica en el cinturón de pinares que rodea la zona de alta montaña (1400 — 1800 m.). En Gran Canaria vive la subespecie *-polatzeki* Hart., cuyas diferencias con la de Tenerife —en cuanto a colorido y tamaño se refiere— parecen ser mínimas. Las poblaciones presentes en la isla de Tenerife muestran un claro índice de crecimiento, mientras que las de Gran Canaria se encuentran en estado crítico. Se impone pues un estudio serio sobre estas últimas y la toma de medidas urgentes que garanticen la supervivencia de este raro endemismo, al que nos atrevemos a catalogar como una reliquia de la era Terciaria.

© Foto y texto: J. J. Bacallado
(Grupo Ornitológico Canario)



FAUNA CANARIA

AVES

MIRLO

Clase: Aves
Orden: Paseriformes
Familia: Turdidos
Género: *Turdus*
Especie: *T. merula* L.

Nombres vulgares: mirlo, merlo, merro
Habitat: Bosques, setos, parques, cultivos

Nidificación: Febrero a Agosto (2 ó 3 puestas)

Número de huevos: 3 a 5.

Longitud: 25 cm. Peso: 75 — 125 gr.

Plumaje: Macho, negro; hembra, marrón oscuro.

Distribución: Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma.

Se trata de un ave de amplia distribución y alta valencia ecológica, es decir, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de formación boscosa, así como a parques y jardines de nuestras ciudades y pueblos, fincas, zonas de cultivos, etc.

Han sido descritas dos subespecies de las Islas Canarias: la ssp. *cabreræ*, según algunos autores típica de Tenerife y Gran Canaria, y la ssp. *agnetæ* de La Palma, Gomera y Hierro. Personalmente opinamos que esta última raza podría tratarse de un ecotipo, con diferencias mínimas que necesitarían de una investigación más a fondo.

Se alimenta de frutos, bayas, granos, insectos y sus larvas, así como de lombrices de tierra, moluscos y desperdicios de comida.

Nidifica sobre zarzas, brezos, hiedras, frutales (piñas de plátano) y numerosos árboles y arbustos, tanto ornamentales como forestales.

Destaca sobremanera por su bello canto.

© Foto y texto: F. Pérez Padrón
(Grupo Ornitológico Canario)

