




© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010



LA CAJA
DE CANARIAS

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS



TRES COLAS

CLASE: Osteictios (Esqueleto óseo).
ORDEN: Percomorphi (Perciformes).
SUBORDEN: Percoidei.
FAMILIA: Anthidae.
GENERO: Anthias.
ESPECIE: *Anthias anthias* (Linnaeus, 1758).

CARACTERES DESCRIPTIVOS: Cuerpo ovoide alto y algo comprimido lateralmente. Grandes escamas por todo el cuerpo y cabeza. Cabeza alta y rostro corto. Ojos grandes. Boca amplia con mandíbula inferior más prominente que la superior. Dientes diminutos. Tercer radio de la dorsal más largo, a partir del cual los demás llevan una membrana pequeña interr radial en la parte posterior alta. Lóbulo inferior de la caudal más alargado y puntiagudo que el superior.

COLORACION: Rosa fuerte o vino en el dorso, más pálido en los flancos, casi plateado en el vientre. Tres bandas anchas amarillentas saliendo de la cercanía de los ojos. Parte posterior de las aletas amarillenta.

HABITAT: Litoral, en zonas rocosas hasta profundidades de 200 m., lo común es encontrarlos en los veriles entre los 20 a 40 m. nadando en posición inversa y formando pequeños cardúmenes.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Mediterráneo, Adriático, Atlántico desde Portugal, Islas de la Macaronesia hasta Angola. Canarias raro.

REPRODUCCION: Ovívpara y en primavera.

ALIMENTACION: Depredador nocturno de gran voracidad. Se alimenta de pequeños crustáceos y moluscos así como de crías de otros peces.

LONGITUD MAXIMA: Puede medir 25 cm., lo común es de 15 a 20 cm.

PESCA Y CURIOSIDADES: Se pesca muy ocasionalmente en alguna nasa o desde embarcación con anzuelo pequeño. Carece de interés gastronómico y comercial. Es un pez muy vistoso. Hasta hace escaso tiempo se le incluía en la familia de los Serránidos (mero, cabrilla, etc.).


RICARDO CASTILLO EGUÍA
 Centro de Tec. Pesquera de Taliarte

FAUNA CANARIA

PECES

PEZ VOLADOR

CLASE: Osteictios (esqueleto óseo).
ORDEN: Synentognathi (Beloniformes).
SUBORDEN: Exocoetoidei.
FAMILIA: Exocoetidae.
GÉNERO: *Hirundichthys*.
ESPECIE: *Hirundichthys speculiger* (Valenciennes, in Cuv. & Val., 1846).



CARACTERES DESCRIPTIVOS: Cuerpo alargado, grueso, algo más aplastado ventralmente. Lóbulo inferior aleta caudal más largo que el superior. Hocico obtuso, más corto que el ojo. Pectoral y ventral alcanzando el origen de la anal. Dientes palatinos presentes. Aletas dorsal y anal, situadas muy detrás del cuerpo. Dorsal baja con radios anteriores más largos. Primer radio de la pectoral sin ramificar.

COLORACIÓN: Dorso azul-verde oscuro. Vientre blanco. Aleta pectoral con un borde posterior blanco.

HÁBITAT: Oceánico y epipelágico. Frecuenta la zona costera. Por la noche forma grandes cardúmenes. Por el día viven más aislados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Atlántico tropical y subtropical. Desde Canarias y Cabo Verde (común) hasta zonas cercanas al Golfo de Guinea. Citado excepcionalmente en el Mar del Norte.

REPRODUCCIÓN: Ovívpara, poco conocida.

ALIMENTACIÓN: Esencialmente de zooplancton.

LONGITUD MÁXIMA: Alcanza 25 cms.

PESCA Y CURIOSIDADES: No existe una pesca dirigida a estos peces. Ocasionalmente pueden ser pescados con traña. Gustan de acercarse a la luz de los focos por la noche, incluso en ocasiones saltan a la borda de los barcos con el consiguiente peligro para marineros y pescadores, gracias a su aleta caudal y su pectoral que le permiten alcanzar grandes velocidades e incluso "volar". Su carne es bastante grasa, de la llamada "azul" pero buena. En Canarias se considera que hay alrededor de 5 especies diferentes de peces voladores.

RICARDO CASTILLO EGUÍA
 Centro de Tecnología Pesquera
 de Gran Canaria